

# Überblick Federwild:


---



Jagdschule AJN Gräfinthal




Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner



Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner









# Hühnervögel

## Waldhühner




## Feldhühner



# Hühnervögel

## Waldhühner



6-10 Eier

28 Tage Brutdauer

Rosen über dem Auge

Kulturflüchter

Im Winter Balzstifte an den Zehen -  
> Schneeschuhfunktion

Ständer voll befiedert

Ganzjährig geschont

Jagdschule AJN

Dr. Bernhard Feichtner

# Hühnervögel

10-20 Eier

24 Tage Brutdauer

Rosen um die Augen

Kulturfolger

Ständer unbefiedert



## Feldhühner



Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner



Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner



Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner

# Ordnung Rabenvögel

- 3-6 Eier
- 17 Tage Brutzeit
- Baumbrüter, Nesthocker (nackt und blind)
- Beide Geschlechter gleich gefärbt, beide brüten
- „Allesfresser“ (Nahrungsgeneralisten)
- Monogam (Jahres- oder Dauerehe)
- Sehr anpassungsfähige Singvögel





Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner

# Ordnung: Tauben

- Monogam ( Jahresehe )
- Baumbrüter in einfachsten Nestern ( Hohltaube: Höhlenbrüter )
- Nesthocker
- 2-3 (4) Bruten / Jahr
- 2 Eier / Brut: Eikonstanz
- 17 Tage Brutdauer 1/2



# Ordnung: Tauben

- Ernährung in den ersten 10 Tagen: Kropfmilch beider Eltern
- Schachtelbrut
- Keine Gallenblase
- Können Wasser saugen
- Ornithose, Papageienkrankheit
- Nur Ringeltaube bejagt



2/2



Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner



Ord.: Lappentaucher

Ord.: Ruderfüßler

Ord.: Kranichvögel: Rallen

# Ordnung Ruderfüßler

- Schnabel mit scharfkantigem Nagel
- Keine Bürzeldrüse, Gefieder durchnässt beim Tauchen
- Überwiegend Fische als Nahrung
- Kolonienbrüter
- Unterliegen dem NaturSchG.



# Ordnung Lappentaucher

- Ruder extrem weit hinten, an Land kaum bewegungsfähig
- Schwimmklappen zwischen den Zehen (s. Name)
- Kurzer dolchartiger Schnabel, Fischfresser
- Schwimmnest mit verrottenden Materialien (Brutwärme), Nestflüchter



# Ordnung Kranichvögel

## Familie: Rallen

- lassen im Flug die Ständer hängen
- gebunden an Feuchtgebiete (außer Wiesenralle)



Grünfüßige  
Teichhuhn

Blesshuhn



Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner

# Wat – und Möwenvögel



Waldschnepfe

Silbermöwe

Gr. Brachvogel


Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner

# Schnepfenvögel

- Bodenbrüter, Nestflüchter
- Eikonstanz: 4 Eier
- 21 Tage Brutdauer
- Stecherschnabel  
(Wurmfresser)
- an Feuchtgebiete gebunden
- Zugvögel (Waldschnepfe  
Teilzieher)



# Schreit- und Stelzvögel





Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner

# Ordnung Eulen

- Überw. nachtaktiv
- starre Augen
- Kopf bis 270 ° drehbar
- Gutes Dämmerungssehen
- asymmetrische Ohren
- Gesichtsschleier
- Unverhakten Schwungfedern, geräuschloser Flug



1/2

# Ordnung Eulen

- Bißtöter und Horstbezieher
- Wendezehe
- Balz ab Januar/Februar
- Brutzeit: 30-40 Tage
- Weiße, fast runde Eier
- Nesthocker ( geschlossenen Augen)
- Hauptnahrung: Mäuse (Gewölle mit Knochen)
- Kein Wild (Naturschutzrecht)

2/2




Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner



Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner

# Ordnung: Greifvögel

## Familie: Habichtsartige





Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner

# Ordnung Greifvögel

## Familie Falken

- Horstbenutzer
- Falkenzahn
- Falkenbart (außer Merlin)
- Dunkle Augen
- „Hände“ zum Halten der Beute
- Töten am Boden mit Biss






Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner



Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner

# Enten- u. Gänsevögel



Enten

Schwimmenten

Tauchenten

Brandenten

Säger

Gänse

Feldgänse

Meeresgänse

Meerenten

