




# Federwild Teil I

---



Präparate Jagdschule AJN  
Gräfinthal

# Ordnung Hühnervögel





# 1. Ordnung: *Hühnervögel*

---

- **Bodenbrüter, Nestflüchter**
- Küken: **tierische Nahrung (bis einschl.3.Wo)**
- **Körnerfresser (Pickschnabel)**
- **Stark ausgeprägter Kropf**
- **Starker Muskelmagen mit *Waidkörnern***
- **Blinddarmlosung (Balzpech)**
- Scharren zur Nahrungssuche (Scharrfüße)
- **Standvögel (Ausnahme : Wachtel, Zugvogel)**
- **Überwiegend am Boden, gute Läufer**



# Familien

## Waldhühner - Feldhühner

---

### ■ Waldhühner

- **28 Tage** Brutdauer
- Rosen **über** dem Auge
- **6-10 Eier** Gelegegröße
- **Kulturflüchter**
- Im Winter **Balzstifte** an den Zehen  
(Schneeschuhfunktion)
- **Ständer voll befiedert**  
(Name)
- Ganzjährig geschont

### ■ Feldhühner

- **24 Tage** Brutdauer
- Rosen **um** die Augen
- **10-20 Eier** Gelegegröße
- **Kulturfolger**
- **Ständer unbefiedert**



## Arbeitsauftrag:

Bitte notieren Sie sich in dieser Reihenfolge die Merkmale! Vergleichen Sie die Ergebnisse und ergänzen Sie gegebenenfalls.

---

- Kennzeichen
- Lebensraum
- Lebensweise
- Balzverhalten
- Altersunterscheidung
- Besonderheiten



# Auerwild

Hühnervogel, Raufußhuhn

- **Geschlechtsdimorphismus**
- **Plenterwald**
- **Polygam**
- **Einzelbalz** ;März-Mai;  
**Baumbalz**
- Hochwild
- Altersunterscheidung:  
Oberschnabel , Schaufelfedern



Nr. 1



Nr.2

Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner

# Birkwild

Hühnervogel, Raufußhuhn

- Geschlechtsdimorphismus
- Moore und Heiden
- Polygam
- Arenabalz, Bodenbalz, Damenwahl
- Altersbestimmung durch Krümmung der Sicheln



# Haselwild

Hühnervogel, Raufußhuhn

- Hahn: schwarzer Kehlfleck  
„**Schwarzkehlchen**“, Holle
- **Niederwald**
- Monogam
- **Verlobungszeit** im Herbst



Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner

Nr. 4



# Alpenschneehuhn

Hühnervogel, Raufußhuhn

- Hahn mit schwarzen Zügeln (Winter)
- **Saisondimorphismus**
- Hochgebirge
- Monogam (Jahresehe)
- Balz: April-Mai
- Schneegänge zur Nahrungssuche im Winter



Nr.5



Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner

# Fasan

Hühnervogel, Glattfußhuhn

- **Geschlechtsdimorphismus**
- Herkunft: **Asien**
- **W**ald, **W**iese, **W**asser, **W**urzeln, **W**eizen (5 \* W)
- **Polygam**, baumt nachts auf
- Einzelbalz: März-April
- „**Gesperre**“ bis zur Herbstmauser
- Altersunterscheidung durch „**Sporn**“
- **Scherentreiben**
- Infanterist (am Boden)
- **Schütte** (überdacht)



Nr.6



Nr.7

Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner

# Rebhuhn

Hühnervogel, Glattfußhuhn

- **Henne mit Querbänderung** an Flügeldeckfedern (Hahn steigt auf die Leiter)
- **Grenzlinienreiche** Kulturlandschaft
- Monogam, Hahn bewacht „**Kette**“, Winter zusammen als „**Volk**“
- **Auflösung der Ketten im Frühjahr** mit Paarbildung (Paarhühner)
- Starker Besatzrückgang
- „**Suche**“ mit Vorstehhund
- „**Schüttungen**“ ohne Dach



Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner

Nr.8

# Wachtel

Hühnervogel, Glattfußhuhn

- Brachflächen
- **Polygam, Zugvogel**
- Wachtelschlag (Balzruf)
- Altvögelüberwiegend animalische Ernährung
- Mit Wiesenralle (**Wachtelkönig**) im gleichen Lebensraum vergesellschaftet



# Steinhuhn

Hühnervogel, Glattfußhuhn

- Alpenbewohner
- Unterliegt Naturschutz



Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner

Nr.76



## 2.Ordnung: *Singvögel*

### Familie Rabenvögel

---

- **3-6 Eier**
- **17 Tage** Brutzeit
- **Baumbrüter**, Nesthocker (nackt und blind)
- Beide **Geschlechter gleich gefärbt, beide brüten**
- „**Allesfresser**“ (Nahrungsgeneralisten)
- **Monogam** (Jahres-oder Dauerehe)
- sehr anpassungsfähige Singvögel





# Kolkrabe

Ordnung: Singvögel, Familie: Rabenvögel

- Klobiger Schnabel,
- **Keilförmiger** Stoß
- Im **Saarland** vorkommend,
- „**Wild**“
- größter Singvogel



# Aaskrähe

Ordnung: Singvögel, Familie: Rabenvögel

## Rabenkrähe (12)

- Schnabelansatz befiedert
- Westl. Form der Aaskrähe
- **Westlich der Elbe**
- Häufigster Rabenvogel
- Z.T. Abschussgenehmigung

## Nebelkrähe (11)

- **Nebelgraues** Gefieder
- Östl. Form der Aaskrähe
- Kreuzungen mit Rabenkrähe möglich



Nr.11

Nr.12



# Saatkrähe

Ordnung: Singvögel, Familie: Rabenvögel

- Schnabelansatz nackt
- **Kolonienbrüter**
- Pflanzenfresser



# Dohle

Ordnung: Singvögel, Familie: Rabenvögel

- Grauer Kopf
- helles Auge
- **Kolonienbrüter**  
(Kirchtürme)



# Elster

Ordnung: Singvögel, Familie: Rabenvögel

- Schwarz-weiß gefärbt,
- **langer Stoß**
- Wendiger Flieger
- **Kugelförmige Nester** mit Zivilisationsmüll
- „**diebische Elster**“
- Großer **Nesträuber**



# Eichelhäher

Ordnung: Singvögel, Familie: Rabenvögel

- Bunt gefärbt
- Waldvogel
- Nahrungsvorräte, „**Hähersaat**“
- Warnruf daher „**Polizist des Waldes**“



# Tannenhäher

Ordnung: Singvögel, Familie: Rabenvögel

- Getropftes Gefieder
- **Nadelwälder**  
(Zirbelkiefer)
- **Invasionsvogel**







## 3.Ordnung: *Tauben*

---

- Monogam (Jahresehe)
- Baumbrüter in **einfachsten Nestern**
- **Hohltaube: Baumhöhlenbrüter**
- Nesthocker (nackt und blind)
- 2-3 (4) Bruten/Jahr
- **2 Eier/ Brut: Eikonstanz**
- **17 Tage** Brutdauer
- Ersten 10 Tage: Junge mit **Kropfmilch** beider Eltern ernährt
- **Schachtelbrut:** Tauber versorgt Ästlinge, während Täubin erneut brütet
- **Keine Gallenblase**
- Können Wasser saugend aufnehmen
- **Körnerfresserschnabel**
- Unterliegen Jagdrecht (**Wild**), nur Ringel- und Türkentauben mit Jagdzeit  
Ornithose, **Papageienkrankheit**



# Ringeltaube

Ordnung: Wildtauben

- weißer Halsfleck, **weiße Flügelbinde**
- „**Pfundstaube**“
- In ganz Deutschland
- Kulturfolger
- Balzflug mit **Flügelklatschen**
- Brüten bereits im März
- Kropfmilch, Getreide
- **Jungtauben fehlt Halsfleck**
- „**Auerhahn des kleinen Mannes**“
- **Jagdzeit** nur vom 1.11-20.2.



# Türkentaube

Ordnung: Wildtauben

- Dunkler **Nackenring**
- Herkunft: **Balkan**
- **Kulturfolger**,  
(schwer bejagbar, da  
überwiegend in befriedeten  
Bezirken)



17



# Turteltaube

Ordnung: Wildtauben

- Kleinste Wildtaube
- Mehrere schwarze streifen am Hals
- **Zugvogel**



18

## 4. Ordnung: *Ruderfüßler*

- Schnabel mit scharfkantigem **Nagel**
- **Keine Bürzeldrüse**, Gefieder durchnässt beim Tauchen
- Überwiegend **Fische** als Nahrung
- **Kolonienbrüter**
- **Naturschutzrecht**
- kein Wild



## 5. Ordnung: *Wat- u. Möwenvögel*

- Möwen
  - Silbermöwe
  - Lachmöwe
  
- Schnepfenvögel
  - Waldschnepfe
  - Bekassine
  - Großer Brachvogel



# 5.Ordnung: Wat- u. Möwenvögel

Familie: Schnepfen

- **Bodenbrüter**, Nestflüchter
- **Eikonstanz: 4 Eier**
- **Stecherschnabel** (Würmer)
- An **Feuchtgebiete** gebunden
- **Zugvögel** (Waldschnepfe Teilzieher)



# Waldschnepfe

Ordnung: Wat-und Möwenvögel, Familie: Schnepfen

- **Bodenbrüter**, Nestflüchter
- **Schnepfenstrich** im zeitigen Frühjahr
- **Eikonstanz: 4 Eier**
- 21 Tage Brutdauer
- **Stecherschnabel** (Würmer)
- An **Feuchtgebiete** gebunden
- **Zugvögel** (Waldschnepfe Teilzieher)
- Trophäe: **Malerfederchen** , **Schnepfenbart**



Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner

Nr.20



# 5.Ordnung: Wat- u. Möwenvögel

Familie: Möwen

- **Bodenbrüter**, Nestflüchter
- **Eikonstanz: 3 Eier**
- **Allesfresser**




79

## 6. Ordnung: *Lappentaucher*

### Haubentaucher

- Schwimmlappen
- Schwimmnest
- Ganzjährig geschont



21

### Zwergtaucher

- Schwimmlappen
- Schwimmnest
- Kein Wild (NaR)



22

## 7. Ordnung: *Kranichvögel*

### 3 Familien:

- Kraniche
- Rallen
- Trappen



23



24



Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner



# 7.Ordnung: *Kranichvögel*

Familie: Rallen

Vier Arten:

- Blässhuhn
- Grünfüßige Teichhuhn
- Wiesenralle
- Wasserralle



Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner

## 8. Ordnung: *Schreit- u. Stelzvögel*

### 3 Familien:

- Reiher

- Graureiher



80

- Dommeln

- Große Rohrdommel



81

- Störche

- Schwarzstorch
- Weißstorch



# Graureiher

Ordnung: Schreit -u. Stelzvögel, Familie: Reiher

- Hals im Flug **S-förmig**
- Feuchtgebiete
- **Kolonienbrüter** auf Bäumen
- Monogam
- **Gewölle**
- Jagdrecht (ganzj. geschont)



# Große Rohrdommel

Ordnung: Schreit -u. Stelzvögel, Familie: Reiher

- Pfahlstellung bei Gefahr
- Feuchtgebiete
- Moorochse
- NaR



Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner

Nr.81