



Federwild Teil I



Präparate Jagdschule AJN
Gräfinthal

Ordnung Hühnervögel






Arbeitsauftrag:

Tierart?


Was wissen Sie zu?:

- Kennzeichen
- Lebensraum
- Lebensweise
- Balzverhalten
- Altersunterscheidung
- Besonderheiten



- 
-
- Bestimmen der Art
 - Wichtiges hierzu






Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Auerwild

Hühnervogel, Raufußhuhn

- **Geschlechtsdimorphismus**
- **Plenterwald**
- **Polygam**
- **Einzelbalz** ;März-Mai;
Baumbalz
- Hochwild
- Altersunterscheidung:
Oberschnabel , Schaufelfedern





Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Birkwild

Hühnervogel, Raufußhuhn

- **Geschlechtsdimorphismus**
- **Moore und Heiden**
- Polygam
- **Arenabalz, Bodenbalz, Damenwahl**
- Altersbestimmung durch **Krümmung der Sichel**





Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner


Haselwild

Hühnervogel, Raufußhuhn

- Hahn: schwarzer Kehlfleck
„**Schwarzkehlchen**“, **Holle**
- **Niederwald**
- Monogam
- **Verlobungszeit** im Herbst



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner




Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Alpenschneehuhn

Hühnervogel, Raufußhuhn

- Hahn mit schwarzen Zügeln (Winter)
- **Saisondimorphismus**
- Hochgebirge
- Monogam (Jahresehe)
- Balz: April-Mai
- **Schneegänge** zur Nahrungssuche im Winter






Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Fasan

Hühnervogel, Glattfußhuhn

- **Geschlechtsdimorphismus**
- Herkunft: **Asien**
- **Wald, Wiese, Wasser, Wurzeln, Weizen** (5 * W)
- **Polygam**, baumt nachts auf
- Einzelbalz: März-April
- „**Gesperre**“ bis zur Herbstmauser
- Altersunterscheidung durch „**Sporn**“
- **Scherentreiben**
- Infanterist (läuft am Boden)
- **Schütte** (überdacht)





Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Rebhuhn

Hühnervogel, Glattfußhuhn

- **Henne mit Querbänderung** an Flügeldeckfedern (Hahn steigt auf die Leiter)
- **Grenzlinsenreiche** Kulturlandschaft
- Monogam, Hahn bewacht „**Kette**“, Winter zusammen als „**Volk**“
- **Auflösung der Ketten im Frühjahr** mit Paarbildung (Paarhühner)
- Starker Besatzrückgang
- „**Suche**“ mit Vorstehhund
- „**Schüttungen**“ ohne Dach



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner


Wachtel

Hühnervogel, Glattfußhuhn

- Brachflächen
- **Polygam, Zugvogel**
- Wachtelschlag (Balzruf)
- Altvögelüberwiegend
animalische Ernährung
- Mit Wiesenralle
(**Wachtelkönig**) im gleichen
Lebensraum vergesellschaftet



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner




Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Steinhuhn

Hühnervogel, Glattfußhuhn

- Alpenbewohner
- Unterliegt Naturschutzrecht





Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner


Kolkrabe

Ordnung: Singvögel, Familie: Rabenvögel

- Klobiger Schnabel,
- **Keilförmiger** Stoß
- Im **Saarland** vorkommend,
- „**Wild**“
- größter Singvogel



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Aaskrähe

Ordnung: Singvögel, Familie: Rabenvögel


Rabenkrähe

- Schnabelansatz befiedert
- Westl. Form der Aaskrähe
- **Westlich der Elbe**
- Häufigster Rabenvogel
- Z.T. Abschussgenehmigung

Nebelkrähe

- **Nebelgraues** Gefieder
- Östl. Form der Aaskrähe
- Kreuzungen mit Rabenkrähe möglich





Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner


Saatkrähe

Ordnung: Singvögel, Familie: Rabenvögel

- Schnabelansatz nackt
- **Kolonienbrüter**
- Pflanzenfresser



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Dohle

Ordnung: Singvögel, Familie: Rabenvögel

- Grauer Kopf
- helles Auge
- **Kolonienbrüter**
(Kirchtürme)



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Elster

Ordnung: Singvögel, Familie: Rabenvögel

- Schwarz-weiß gefärbt,
- **langer Stoß**
- Wendiger Flieger
- **Kugelförmige Nester**
mit Zivilisationsmüll
- „**diebische Elster**“
- Großer **Nesträuber**



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner




Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner


Eichelhäher

Ordnung: Singvögel, Familie: Rabenvögel

- Bunt gefärbt
- Waldvogel
- Nahrungsvorräte,
„**Hähersaat**“
- Warnruf daher „**Polizist
des Waldes**“



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Tannenhäher



Ordnung: Singvögel, Familie: Rabenvögel

- Getropftes Gefieder
- **Nadelwälder**
(Zirbelkiefer)
- **Invasionsvogel**



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Nr.78




Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner


Ringeltaube

Ordnung: Wildtauben

- weißer Halsfleck, **weiße Flügelbinde**
- „**Pfundstaube**“
- In ganz Deutschland
- Kulturfolger
- Balzflug mit **Flügelklatschen**
- Brüten bereits im März
- Kropfmilch, Getreide
- **Jungtauben fehlt Halsfleck**
- „**Auerhahn des kleinen Mannes**“
- **Jagdzeit** nur vom 1.11-20.2.



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner




Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Türkentaube

Ordnung: Wildtauben

- Dunkler **Nackenring**
- Herkunft: **Balkan**
- **Kulturfolger**,
(schwer bejagbar, da
überwiegend in befriedeten
Bezirken)





Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Turteltaube

Ordnung: Wildtauben

- Kleinste Wildtaube
- Mehrere schwarze streifen am Hals
- **Zugvogel**





Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner


Waldschnepfe

Ordnung: Wat-und Möwenvögel, Familie: Schnepfen

- **Bodenbrüter**, Nestflüchter
- **Schnepfenstrich** im zeitigen Frühjahr
- **Eikonstanz: 4 Eier**
- 21 Tage Brutdauer
- **Stecherschnabel** (Würmer)
- An **Feuchtgebiete** gebunden
- **Zugvögel** (Waldschnepfe Teilzieher)
- Trophäe: **Malerfederchen** , **Schnepfenbart**



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

5. Ordnung: Wat- u. Möwenvögel

Familie: Möwen

- **Bodenbrüter**, Nestflüchter
- **Eikonstanz: 3 Eier**
- **Allesfresser**





6. Ordnung: *Lappentaucher*

Haubentaucher

- Schwimmflappen
- Schwimmnest
- Ganzjährig geschont



Zwergtaucher

- Schwimmflappen
- Schwimmnest
- Kein Wild (NaR)





Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

7.Ordnung: *Kranichvögel*

Familie: Rallen

Vier Arten:

- Hier:
 - Blässhuhn
 - Grünfüßige Teichhuhn





Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner


Graureiher

Ordnung: Schreit -u. Stelzvögel, Familie: Reiher

- Hals im Flug **S-förmig**
- Feuchtgebiete
- **Kolonienbrüter** auf Bäumen
- Monogam
- **Gewölle**
- Jagdrecht (ganzj. geschont)



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner




Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Schwarzstorch

Ordnung: Schreit -u. Stelzvögel, Familie: Störche

- überwiegend **schwarz**, lange Ständer,
- im Flug Hals **waagrecht**
- Lebensraum: **feuchte Waldgebiete**
- Lebensweise: scheuer **Kulturflüchter, Zugvogel**, Monogam, stark gefährdet,
- **NaR**





Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Große Rohrdommel

Ordnung: Schreit -u. Stelzvögel, Familie: Reiher

- Pfahlstellung bei Gefahr
- Feuchtgebiete
- Moorochse
- NaR



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner