



# Überblick Federwild:

---




Jagdschule AJN Gräfinthal



Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner






Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner




# 1. Ordnung: *Hühnervögel*

- Gemeinsamkeiten



# Hühnervögel

- **Bodenbrüter, Nestflüchter**
- Küken: **tierische Nahrung**  
(bis einschl.3.Woche)
- **Körnerfresser (Pickschnabel)**
- **Stark ausgeprägter Kropf**
- **Starker Muskelmagen mit *Waidkörnern***
- **Blinddarmlosung (Balzpech)**
- Scharren zur Nahrungssuche (Scharrfüße)
- **Standvögel (Ausnahme : Wachtel, Zugvogel)**
- **Überwiegend am Boden, gute Läufer**



# Familien

## Waldhühner - Feldhühner

---

### ■ Waldhühner

Gemeinsamkeiten

### ■ Feldhühner

Gemeinsamkeiten



# Familien

## Waldhühner - Feldhühner

---

### ■ Waldhühner

- **28 Tage** Brutdauer
- Rosen **über** dem Auge
- **6-10 Eier** Gelegegröße
- **Kulturflüchter**
- Im Winter **Balzstifte** an den Zehen  
(Schneeschuhfunktion)
- **Ständer voll befiedert**  
(Name)
- Ganzjährig geschont

### ■ Feldhühner

- **24 Tage** Brutdauer
- Rosen **um** die Augen
- **10-20 Eier** Gelegegröße
- **Kulturfolger**
- **Ständer unbefiedert**






# Bestimmen Sie die Vogelart








# Waldhühner



# Bestimmen Sie die Vogelart



# Feldhühner



Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner





- 
- Arten
  - Gemeinsamkeiten



Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner





# Ordnung: Tauben (1)

- Monogam ( Jahressehe )
- **Baumbrüter** in einfachsten Nestern ( Hohltaube: **Höhlenbrüter** )
- Nesthocker
- 2-3 (4) Bruten / Jahr
- **2 Eier** / Brut: **Eikonstanz**
- 17 Tage Brutdauer



# Ordnung: Tauben (2)

- Ernährung in den ersten 10 Tagen: **Kropfmilch** beider Eltern
- **Schachtelbrut**
- **Keine Gallenblase**
- Können Wasser saugen
- Ornithose, Papageienkrankheit
- Nur Ringeltaube bejagt



# Ordnung Rabenvögel

- Gemeinsamkeiten



# Ordnung Rabenvögel

- 3-6 Eier
- 17 Tage Brutzeit
- **Baumbrüter, Nesthocker**  
(nackt und blind)
- Beide Geschlechter **gleich**  
gefärbt, **beide** brüten
- „**Allesfresser**“  
(Nahrungsgeneralisten)
- **Monogam** (Jahres- oder  
Dauerehe)
- **Sehr anpassungsfähige  
Singvögel**





# Bestimmen Sie die Vogelart





Saatkrähe

Kolkrabe

Rabenkrähe

Dohle

Elster

Nebelkrähe

Tannenhäher

Eichelhäher

Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner

# Schnepfenvögel

- Gemeinsamkeiten



# Schnepfenvögel

- Bodenbrüter, Nestflüchter
- Eikonstanz: 4 Eier
- 21 Tage Brutdauer
- Stecherschnabel  
(Wurmfresser)
- an Feuchtgebiete gebunden
- Zugvögel (Waldschnepfe  
Teilzieher)





# Bestimmen Sie die Vogelart



Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner

# Wat – und Möwenvögel

## Familie Möwen / Familie Schnepfen




Waldschnepfe


Silbermöwe

Großer Brachvogel



# Bestimmen Sie die Ordnung





Ord.: Lappentaucher

Ord.: Ruderfüßler

Ord.: Kranichvögel: Rallen



# Ordnung Ruderfüßler

- Art
- Gemeinsamkeiten



Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner

# Ordnung Ruderfüßler

- Schnabel mit scharfkantigem Nagel
- Keine Bürzeldrüse, Gefieder durchnässt beim Tauchen
- Überwiegend Fische als Nahrung
- Kolonienbrüter
- Unterliegen dem NaturSchG.



# Ordnung Lappentaucher

- Arten
- Gemeinsamkeiten



# Ordnung Lappentaucher

- Ruder extrem weit hinten, an Land kaum bewegungsfähig
- Schwimmklappen zwischen den Zehen (s. Name)
- Kurzer dolchartiger Schnabel, Fischfresser
- Schwimmnest mit verrottenden Materialien (Brutwärme), Nestflüchter





# Ordnung Kranichvögel

## Familie: Rallen

- Arten
- Gemeinsamkeiten





# Ordnung Kranichvögel

## Familie: Rallen


- lassen im Flug die Ständer hängen
- gebunden an Feuchtgebiete (außer Wiesenralle)



Grünfüßige  
Teichhuhn

Blesshuhn


# Bestimmen Sie die Vogelarten





# Ordnung: Greifvögel

## Familie: Habichtsartige



# Milane

Greifvogel, Habichtsartige

- Gemeinsamkeiten





# Milane

Greifvogel, Habichtsartige

- Lumpensammler
- Bettelflug
- Feuchtgebiete
- Zugvögel
- Arten
  - Schwarzer Milan
  - Roter Milan



# Weihen

Greifvogel, Habichtsartige

- **Gemeinsamkeiten**



Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner

# Weihen

Greifvogel, Habichtsartige

- Eulenartiger **Gesichtsschleier**
- **Schlanker** Körper, dünne Ständer
- **Geschlechtsdimorphismus**
- **Schaukelnder** Flug
- **Bodenbrüter (Nesthocker)**
- Feuchtgebiete
- Zuvogel



Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner

# Habichte

Greifvogel, Habichtsartige

## Gemeinsamkeiten





# Habichte

Greifvogel, Habichtsartige

## Pirsch u. Startfluggreifer

- **Grifftöter**
- Terzel 1/3 **kleiner** als Weib
- Geschlechtsdimorphismus
- **Waldbewohner**
- Langer Stoß, **wendige** Flieger
- Weib brütet (**Brutmauser**),  
Terzel schlägt Beute
- **Atzung** durch **Weib**



# Ordnung Greifvögel

## Familie Falken

### Gemeinsamkeiten



# Ordnung Greifvögel

## Familie Falken

### Gemeinsamkeiten

- **Bisstöter**
- **Horstbenutzer**
- **Falkenzahn**
- **Töten** am Boden
- Dunkle Augen
- **Falkenbart** (außer Merlin)
- Spitz zulaufende gewinkelte Schwingen






# Bestimmen Sie die Vogelarten



# Ordnung Greifvögel

## Familie Falken




Turmfalke m.

Turmfalke w.

Wanderfalke juv.

# Ordnung Eulen

- Gemeinsamkeiten




Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner

# Ordnung Eulen

- Bißtöter und Horstbezieher
- Wendezehe
- Balz ab Januar/Februar
- Brutzeit: 30-40 Tage
- Weiße, fast runde Eier
- Nesthocker ( geschlossenen Augen)
- Hauptnahrung: Mäuse (Gewölle mit Knochen)
- Kein Wild (Naturschutzrecht)

2/2



Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner





Bestimmen  
Sie die Arten



Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner

# Eulen



Waldkauz

Steinkauz

Uhu

Waldohreule

Schleiereule

Sumpfohreule

Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner



# Enten

- Gemeinsamkeiten





## Gemeinsamkeiten der Enten

- **Bodenbrüter** (**Ausn.** : Brand,- Schell,-Stockente)
- Nestflüchter
- **Monogam**
- Geschlechtsdimorphismus
- **Verlobung**, Reihzeit
- 8-14 Eier, 26 Tage Brutzeit
- **Allesfresser**






# Vergleich

## ■ Schwimmenten

Gemeinsamkeiten

## ■ Tauchenten

Gemeinsamkeiten




# Vergleich

## Schwimmenten

- **Gründeln**
- Stoß ragt **aus** dem Wasser
- Ruder **mittig** am Körper
- **Senkrechtsstart**
- Flache Fließgewässer
  
- Häufigste: **Stockente**

## Tauchenten

- **Tauchen**
- Stoß **flach** auf dem Wasser
- Ruder relativ weit **hinten**
- **Anlauf** nötig
- Auch an größeren Binnengewässern
  
- Häufigsten: **Reiher-** und **Tafelenten**








# Enten- u. Gänsevögel

Jagdschule AJN  
Dr. Bernhard Feichtner



Enten

Schwimmenten

Tauchenten

Säger

Brandenten

Meerenten


Gänse

Feldgänse

Meeresgänse



# Gemeinsamkeiten der Gänse





## Gemeinsamkeiten der Gänse

- **Bodenbrüter ; Nestflüchter**
- Monogam **Lebensehen**
- Kein Geschlechtsdimorphismus
- 4-8 Eier, 28 Tage Brutzeit
- Reine Vegetarier, **Rupfschnabel**
- Nachts auf Wasser, **tagsüber an Land**

# Bestimmen Sie die Arten

