


Federwild Teil II




Greifvögel und Eulen

Jagdschule AJN Gräfinthal

10. Ordnung: Greifvögel



Systematik der Habichtsartigen




Bussarde

Greifvogel, Habichtsartige

Gleitstoßgreifer
Grifftöter

Arten:

- Mäusebussard
- Raufußbussard
- Wespenbussard



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner



Mäusebussard

Greifvogel, Habichtsartige

- **8-12 Querbinden**, dunkles Auge, **Farbvariationen**
- **Kulturfolger**,
- häufigster Greif
- **80% Mäuse**, auch Aas
- Rüttelt, begrünt den Horst, blockt auf **Zaunpfählen** auf



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Raufußbussard

Greifvogel, Habichtsartige

- Dunkles Auge, Ständer voll **befiedert**,
- **1 dunkle Stoßbinde**
- **Wintergast**
- Baumbrüter



Wespenbussard

Greifvogel, Habichtsartige

- **3 dunkle Stoßbinden,**
- **Schuppenfedern,**
- Hornplatten
- Sommergast, zieht nach Zentralafrika
- **Nahrungsspezialist**
- Begrünt Horst



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Milane

Greifvogel, Habichtsartige

- Lumpensammler
- Bettelflug
- Feuchtgebiete
- Zugvögel
- Arten
 - Schwarzer Milan
 - Roter Milan



Roter Milan

Greifvogel, Habichtsartige

- Tief gegabelter Stoß, **Gabelweihe**
- Zugvogel
- Hauptvorkommen: **Deutschland**



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner



Schwarzer Milan

Greifvogel, Habichtsartige

- **Leicht** gegabelter Stoß
- **Dunkel** gefärbt
- **Häufigster** Greifvogel weltweit
- Aasjäger
- Zugvogel



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Weihen

Greifvogel, Habichtsartige

- Eulenartiger **Gesichtsschleier**
- **Schlanker** Körper, dünne Ständer
- **Geschlechtsdimorphismus**
- **Schaukelnder** Flug
- **Bodenbrüter (Nesthocker)**
- Feuchtgebiete
- Zuvogel



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Wiesenweihe

Greifvogel, Habichtsartige

- Rohrweihe
 - Größte Weihe
 - **Brütet im Schilf**
 - Weib mit gelbem Kopf
- Kornweihe
 - Weißer Bürzelfleck
 - **Brütet in Getreideschlägen**
 - Weib braun, Terzel grau
- **Wiesenweihe**
 - Kleinste Weihe
 - **Brütet in Wiesen**
 - Weib braun, Terzel grau



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Habichte

Greifvogel, Habichtsartige

Pirsch u. Startfluggreifer

- **Grifftöter**
- Terzel 1/3 **kleiner** als Weib
- Geschlechtsdimorphismus
- **Waldbewohner**
- Langer Stoß, **wendige** Flieger
- Weib brütet (**Brutmauser**),
Terzel schlägt Beute
- **Atzung** durch **Weib**



Habicht

Greifvogel, Habichtsartige

- **Althabicht:** grau und **quergebändert**, orangefarbenes Auge
- **Junghabicht:** Rothabicht, rötlich **getropft**, Jugendkleid: **Schutzkleid** (Territorialverhalten), gelbes Auge
- **Waldgebiete**
- **Ernährung:** Weib bis **Hasengröße**, Terzel bis Taubengröße
- Horst im **oberen Kronenbereich**, **begrünt** Horst
- Standvogel



Sperber

Greifvogel, Habichtsartige

- Terzel (bunt): **Sprinz**
deutlicher
Geschlechtsdimorphismus
- **Kleinvogelspezialist**
- Standvogel
- Horst im **mittleren**
Stammbereich von
jüngeren Bäumen
- Horst wird jährlich neu
gebaut, **nicht begrünt**



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Falken

Greifvogel, Falken

- Unechte Falken:
Turmfalke

- Schlagen am Boden
- Gleitstoßgreifer



- Echte Falken:
Wanderfalke, Baumfalke

- Schlagen in der Luft
- Stoßfluggreifer



Falken

Greifvogel, Falken

- **Bisstöter**
- **Horstbenutzer**
- **Falkenzahn**
- **Töten** am Boden
- Dunkle Augen
- **Falkenbart** (außer Merlin)
- Spitz zulaufende gewinkelte Schwingen



Turmfalke

Greifvogel, Falken

- Terzel: schiefergrauer Kopf
- **Häufigster** Falke
- **Kulturfolger**
- **Mäuse**
- **Felsnischenbrüter**
- „rüttelt“ , **Rüttelfalke**



Wanderfalke

Greifvogel, Falken

- **größter** heimischer Falke
- Oberseite: dunkel, Unterseite hell
- **Offene** Landschaften
- Vogeljäger: **Tauben**
- **Felsenbrüter**
- Jagdrevier bis 6000 ha (Name)
- Kein Zugvogel




Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

9. Ordnung: *Eulen*

- Steinkauz
- Waldkauz
- Uhu
- Waldohreule
- Sumpfohreule
- Schleiereule





Kennzeichen: Eulen

Starre Augen, nachtaktiv

Kopf bis 270 Grad drehbar

Asymmetrische Ohren

Gesichtsschleier

Unverhakte Schwungfedern, **geräuschloser** Flug

Bisstöter, Horstbezieher, **Wendezehe**

Balz: Januar- Februar

30-40 Tage Brut

weiße, runde Eier

Nesthocker,

Mäuse, Gewölle mit **Knochen**

Kein Wild, **Naturschutzrecht**



9.Ordnung: *Eulen*

Uhu

- **orangefarbene** Augen,
- **Federohren**
- **größte** Eule
- **Felsnischenbrüter**
- Früher **Hütten- oder Aufjagd** mit lebendem Uhu



9.Ordnung: *Eulen*

Waldohreule

- **Federohren,**
- **orangefarbene** Augen
- alte **Rabenvogelnester** und Greifvogelhorste
- **Schlafgemeinschaften**



9. Ordnung: *Eulen*

Steinkauz

- Gelbes Auge
- **Baumhöhlenbrüter**
- Insekten
- **Totenvogel**



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

9. Ordnung: *Eulen*

Sumpfohreule

- Gelbes Auge
- **Bodenbrüter**
(Nesthocker!)



9. Ordnung: *Eulen*

Schleiereule

- Heller **Gesichtsschleier**, dunkle Augen
- **Scheunen** und Gemäuer
- **Schachtelbrut**
- Starker **Rückgang** aufgrund von fehlenden Brutstätten



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

9.Ordnung: *Eulen*

Waldkauz

- Dunkle Augen
- **größter** Kauz
- **Baumhöhlenbrüter**
- **Häufigste** Eule



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner